

SGGG Informationsblatt für Anwenderinnen kombinierter hormonaler Kontrazeptiva (Stand 1/2023)

Autoren: G.S. Merki-Feld, S.Tschudin, B. Imthurn, D.Wunder.

Kombinierte hormonale Verhütungspräparate schützen sehr wirksam vor einer Schwangerschaft. Sie enthalten zwei Hormontypen, ein Östrogen und ein Gelbkörperhormon. Heute steht eine ganze Palette von Kombinationen mit verschiedenen Östrogenen, aber auch Gelbkörperhormonen (Gestagenen) zur Verfügung. Sie können angewandt werden als Pille, Scheidenring oder Pflaster. Selten kann es durch die Anwendung dieser Hormone zu schwereren Komplikationen kommen wie beispielsweise einer Venenthrombose oder einer Lungenembolie.

Einige Verhütungspräparate haben ein geringeres Risiko als andere (siehe unten).

Um das Risiko für ein solches Ereignis zu reduzieren, wird Ihr Arzt Sie ausführlich zu bestimmten Risikofaktoren befragen. Das Risiko erhöht sich mit zunehmendem Alter (> 35 Jahre), Rauchen, Auftreten von Gerinnselbildungen in einem Blutgefäss (Thrombosen) bei einem Familienmitglied, Übergewicht, erhöhten Blutfettwerten, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Migräne, Herzklappenerkrankungen, in Situationen mit längerer Bettlägerigkeit oder im Zusammenhang mit Operationen.

Falls Risikofaktoren bei Ihnen vorliegen muss Ihr Arzt genau abklären, ob Ihnen ein kombiniertes Verhütungspräparat verschrieben werden kann.

Als Anwenderin können Sie selbst Ihr Risiko für ein thromboembolisches Ereignis oder eine Lungenembolie reduzieren, indem Sie beispielsweise nicht rauchen und darauf achten, dass Ihr Gewicht innerhalb des Normbereiches ist. Während der Anwendung hormonaler Verhütungsmittel ist eine jährliche ärztliche Kontrolle empfohlen.

Es können auch harmlose Nebenwirkungen (siehe unten) in den ersten Wochen der Pilleneinnahme auftreten. Diese bilden sich meist spontan zurück. Falls dies nicht der Fall ist, kann oft der Wechsel auf ein anderes Verhütungspräparat hilfreich sein.

- Die auf dem Markt verfügbaren Verhütungspräparate unterscheiden sich je nach Gestagen im Verhütungspräparat geringfügig hinsichtlich des mit der Anwendung verbundenen Risikos für eine Thrombose. Die Diskussion dieser Unterschiede ist Teil des Informationsgespräches, welches Ihre ÄrztIn mit Ihnen führt. Nach heutigem Wissen sind Präparate mit Estradiol/Nomegestrolacetat oder Ethinlyestradiol/Levonorgestrel am risikoärmsten.
- Bitte lesen Sie auch die der Medikamentenpackung beiliegende Patiententinneninformation

Schwerwiegende Nebenwirkungen von kombinierten Verhütungspräparaten (CHC):

Bei Anwendung eines Verhütungsmittels mit einem Oestrogen und einem Gestagen besteht ein leicht erhöhtes Risiko für einen Gefässverschluss in Venen oder Arterien (Thrombose oder Embolie). Dies führt sehr selten zu schweren Gesundheitsschäden oder extrem selten sogar zum Tod. Das Risiko für eine solche Komplikation ist während des ersten Anwendungsjahres am Höchsten. Um Komplikationen eines solchen Gefässverschlusses soweit wie möglich zu vermeiden ist es wichtig diese Ereignisse frühzeitig zu erkennen und bei verdächtigen Symptomen sofort den Arzt aufzusuchen. Bitte informieren Sie sich deshalb über die untenstehenden möglichen Symptome und kontaktieren Sie sofort einen Arzt falls diese auftreten.

Typische Symptome für einen venösen oder arteriellen Gefässverschluss:

- Tiefe Venenthrombose:
Einseitige Schwellung des Beines oder entlang einer Vene des Beines, Spannungsgefühl oder Schmerzen in einem Bein, auch wenn sie nur beim Stehen oder Laufen spürbar sind, Überwärmung, Rötung oder Verfärbung der Haut am betroffenen Bereich.
- Lungenembolie:
Plötzliche unerklärliche Kurzatmigkeit, schnelles Atmen oder Atemnot,
Plötzliches Auftreten von Husten, ev. mit blutigem Sputum.
Plötzlicher starker Schmerz im Brustkorb, welcher sich bei tiefer Atmung verstärken kann.
Starke Benommenheit, Schwindel oder Angstgefühl.
Sehr schneller Herzschlag oder unregelmässiger Herzschlag.
- Hirnfarkt:
Plötzliche Taubheit, einseitige Gefühlsstörung oder Kraftlosigkeit in Gesicht, Arm oder Bein, plötzliche Verwirrtheit.
Undeutliche Aussprache oder Verständnisprobleme.
Plötzliche Sehstörungen in einem oder beiden Augen.
Plötzliche Gehstörungen, Schwindel.
Plötzliche schwere oder länger anhaltende Kopfschmerzen unbekannter Ursache
Bewusstseinsverlust oder Ohnmacht mit und ohne Krampfanfall.
- Andere Symptome eines Gefässverschlusses können sein:
Starker Schmerz oder bläuliche Verfärbung von Arm oder Bein.
Plötzlicher starker Bauchschmerz

Bei folgenden Beschwerden sollten Sie die Pilleneinnahme sofort abbrechen und Ihre Ärztin kontaktieren:

- Neu auftretende Migräne oder ungewohnt starke Kopfschmerzen.
- Plötzliche Atembeschwerden oder plötzliches Auftreten von Husten unklarer Ursache.
- Unerklärliche Beinschmerzen mit oder ohne Schwellung.
- Plötzliche Seh-, Hör-, Sprech- oder sonstige Wahrnehmungsstörung.
- Plötzlicher starker Schmerz im Oberbauch oder Brustkorb mit oder ohne Ausstrahlung in den Arm.
- Plötzliches Auftreten von Schwindel, Schwächegefühlen, Gefühlsstörungen.
- Kollaps mit oder ohne Krampfanfälle.
- Depressive Verstimmung ausgeprägter Art

Harmlose Nebenwirkungen sind häufig spontan rückläufig oder lassen sich durch den Wechsel des Präparates modifizieren

- Brustspannen
- Zwischenblutungen
- Stimmungs- oder Libidoveränderungen
- Leichte Kopfschmerzen
- Veränderungen des Appetits oder des Gewichtes.